DES de Biologie Médicale
Enseignement d'Immunologie

CM3.1

Structure et polymorphisme du CMH; Présentation de l'antigène au TCR

Adrien Six (adrien.six@upmc.fr)
Université Pierre et Marie Curie

Phnom Penh
septembre 2009

DESLI2009_Phnom Penh

1

Structure et polymorphisme du CMH; Présentation de l'antigène au TCR

1. Structure et polymorphisme du CMH
2. Rôle du CMH: greffe & cytotoxicité
3. Présentation antigénique par le CMH
4. Structure du complexe TCR-CD3
5. Conclusion

DESLI2009_Phnom Penh

2

Structure et polymorphisme du CMH; Présentation de l'antigène au TCR

1. **Structure et polymorphisme du CMH**
2. Rôle du CMH: greffe & cytotoxicité
3. Présentation antigénique par le CMH
4. Structure du complexe TCR-CD3
5. Conclusion

DESLI2009_Phnom Penh

3

Complexe majeur d'histocompatibilité

- Complexe génétique codant les molécules du CMH de classes I et II → présentation antigénique de peptides aux lymphocytes T
- Expression cellulaire:
 - CMH I → expression ~ubiquitaire
 - CMH II → ϕ dendritiques, macrophages, ϕ B (APC)
- Fort degré de polymorphisme
- Rôle dominant en transplantation → rejet de greffe
- MHC de classe III: molécules du complément, $\text{TNF}\alpha$ et lymphotoxine

DESLI2009_Phnom Penh

4

DESLI2009_Phom Penh

5

DESLI2009_Phom Penh

6

Définition des haplotypes du CMH

TABLE 8-1 H-2 haplotypes of some mouse strains

Prototype strain	Other strains with the same haplotype	Haplotype	H-2 ALLELES				
			K	IA	IE	S	D
CBA	AKR, C3H, B10.BR, C57BR	k	k	k	k	k	k
DBA/2	BALB/c, NZB, SEA, YBR	d	d	d	d	d	d
C57BL/10 (B10)	C57BL/6, C57L, C3H.SW, LP, 129	b	b	b	b	b	b
A	A/He, A/5n, A/Wy, B10.A	a	k	k	k	d	d
B10.A (2R)*		b2	k	k	k	d	b
B10.A (3R)		i3	b	b	b	k	d
B10A (4R)		b4	k	k	b	b	b
A.SW	B10.S, SJL	s	s	s	s	s	s
A.TL		t1	s	k	k	k	d
DBA/1	STOLL, B10.Q, BDP	q	q	q	q	q	q

*The R designates a recombinant haplotype, in this case between the H-2^k and H-2^b types. Gene contribution from the a strain is shown in yellow and from the b strain in red.

Table 8-1
Kuby IMMUNOLOGY, Sixth Edition
© 2007 W.H. Freeman and Company

Haplotype: combinaison d'allèles au locus du CMH

DESLI2009_Phom Penh

7

Polymorphisme allélique du CMH

Figure 5-13 Immunobiology, 6/e. © Garland Science 2005

DESLI2009_Phom Penh

8

Expression codominante du CMH

Figure 8-12
Kuby IMMUNOLOGY, Sixth Edition
© 2007 W.H. Freeman and Company

Structure et polymorphisme du CMH; Présentation de l'antigène au TCR

1. Structure et polymorphisme du CMH
2. **Rôle du CMH: greffe & cytotoxicité**
3. Présentation antigénique par le CMH
4. Structure du complexe TCR-CD3
5. Conclusion

Le CMH contrôle le rejet de greffe

Figure 8-2b
Kuby IMMUNOLOGY, Sixth Edition
© 2007 W.H. Freeman and Company

Le CMH contrôle les réponses cellulaires

Figure 8-15
Kuby IMMUNOLOGY, Sixth Edition
© 2007 W.H. Freeman and Company

Le CMH contrôle les réponses cellulaires

STRAIN	CBA	F ₁ HYBRID	DBA/2
H-2 GENOTYPE		$k \times d$ ↓ 	
LYMPHOCYTES (H-2 PHENOTYPE)			
ANTI-H-2 ^k	killing	killing	—
ANTI-H-2 ^d	—	killing	killing

From: Roitt's Essential Immunology Eleventh Edition

DESLI2009, Phnom Penh 13

Structure et polymorphisme du CMH; Présentation de l'antigène au TCR

1. Structure et polymorphisme du CMH
2. Rôle du CMH: greffe & cytotoxicité
3. **Présentation antigénique par le CMH**
4. Structure du complexe TCR-CD3
5. Conclusion

DESLI2009, Phnom Penh 14

Rappel de biologie cellulaire

Figure 5-1 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

DESLI2009, Phnom Penh 15

Les molécules de CMH fixent des peptides

EXPERIMENTAL CONDITIONS

T-CELL ACTIVATION

(a) APC + Antigen → APC (1 h) → T-cell activation: —

(b) APC + Antigen → APC (1 h) → Fixation → APC + T_H cell → T-cell activation: +

(c) APC + Antigen peptides → APC (1 h) → Fixation → APC + T_H cell → T-cell activation: +

Figure 8-16
Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

DESLI2009, Phnom Penh 16

Structure des molécules du CMH

Figure 8-3
Atly IMMUNOLOGY, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

DESLI2009_Phnom Penh

21

Nature des peptides liés au CMH

(a) Class I MHC (b) Class II MHC

Figure 8-7
Atly IMMUNOLOGY, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

Domaine de fixation	$\alpha 1/\alpha 2$	$\alpha 1/\beta 1$
Nature de la poche	fermée	ouverte
Taille des peptides	8-10 aa	13-18 aa
Résidus d'ancrage	aux extrémités	tout au long
Nature du peptide	structure étirée aux extrém. arche au centre	structure étirée à plat au fond

DESLI2009_Phnom Penh

22

Conformation des peptides MHC I

Figure 3-23 Immunobiology, 6/e, © Garland Science 2005

DESLI2009_Phnom Penh

23

Résidus d'ancrage peptidique MHC I

A = alanine	K = lysine	R = arginine
E = glutamic acid	L = leucine	S = serine
F = phenylalanine	N = asparagine	T = threonine
G = glycine	P = proline	V = valine
H = histidine	Q = glutamine	Y = tyrosine
I = isoleucine		

Figure 8-8
Atly IMMUNOLOGY, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

DESLI2009_Phnom Penh

24

Conformation des peptides MHC II

Figure 3-25 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

DESLI2009, Phnom Penh

25

Résidus d'ancrage peptidique MHC II

Figure 3-26 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

DESLI2009, Phnom Penh

26

Polymorphisme et présentation peptidique

Figure 5-16 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

DESLI2009, Phnom Penh

27

Structure et polymorphisme du CMH; Présentation de l'antigène au TCR

1. Structure et polymorphisme du CMH
2. Rôle du CMH: greffe & cytotoxicité
3. Présentation antigénique par le CMH
4. **Structure du complexe TCR-CD3**
5. Conclusion

DESLI2009, Phnom Penh

28

Les lymphocytes B et T

Immunoglobulin
TCR

B lymphocyte
T lymphocyte

→ caractérisés par leur récepteur spécifique d'antigène

DESCLI2009, Phnom Penh 29

Identification du récepteur T (TCR)

Supposé être un variant d'anticorps:

- Structure similaire
- Formes membranaires et solubles
- Sécrétion importante

→ Essai de purification de récepteur mais...

Anticorps monoclonaux contre le TCR montre une expression membranaire exclusive et faible (1983)

DESCLI2009, Phnom Penh 30

Lymphocytes T $\alpha\beta$ et $\gamma\delta$

Les lymphocytes T comprennent deux populations :

	PBL	
Lymphocytes T $\alpha\beta$	→ TCR $\alpha\beta$	90-99%
Lymphocytes T $\gamma\delta$	→ TCR $\gamma\delta$	1-10%

DESCLI2009, Phnom Penh 31

Le complexe TCR – CD3

- Hétérodimère de chaînes α et β (ou γ et δ)
- Chaque chaîne comprend une région constante et une région variable
- Les régions variables portent le site de liaison au complexe peptide-CMH
- Le TCR est associé aux molécules de transduction du signal CD3 (ITAM)

DESCLI2009, Phnom Penh 32

Reconnaissance par le TCR $\alpha\beta$

- A l'inverse des anticorps qui reconnaissent les protéines natives, le TCR reconnaît des petits *peptides*
 - produits de dégradation des protéines
 - présentés par les molécules du CMH
- Pendant leur différenciation dans le thymus, les lymphocytes T sont "éduqués" pour reconnaître les molécules du CMH de l'organisme → *restriction par le CMH*
- Lymphocytes T périphériques:
 - Auxiliaires CD4+ $\leftrightarrow$ CMH de classe II
 - Cytotoxiques CD8+ $\leftrightarrow$ CMH de classe I

DESCLI2009, Phnom Penh

33

Restriction par le CMH

DESCLI2009, Phnom Penh

34

La reconnaissance TCR/CMH/Peptide

DESCLI2009, Phnom Penh

35

Liaison CD4/CMH II & CD8/CMH I

Figure 3-16 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

DESCLI2009, Phnom Penh

36

Le complexe TCR/CMH/Peptide

DESLI2009, Phnom Penh

37

Reconnaissance par le TCR $\gamma\delta$

- Intermédiaire entre anticorps et TCR $\alpha\beta$ en structure et fonction
- Reconnaît l'antigène de différentes manières:
 - reconnaissance restreinte par le CMH
 - présentation par des molécules du CMH non classiques (class Ib, CD1)
 - reconnaissance directe de l'antigène
 - reconnaissance d'antigènes non-peptidiques (lipides, glycolipides, phospholipides)

DESLI2009, Phnom Penh

38

Structure et polymorphisme du CMH; Présentation de l'antigène au TCR

1. Structure et polymorphisme du CMH
2. Rôle du CMH: greffe & cytotoxicité
3. Présentation antigénique par le CMH
4. Structure du complexe TCR-CD3
5. **Conclusion**

DESLI2009, Phnom Penh

39

DESLI2009, Phnom Penh

Figure 3-21 part 2 of 2 Immunobiology, 6/e, © Garland Science 2005

40