DES de Biologie Médicale Enseignement d'Immunologie

CM3.2

Cellules présentatrices d'antigène et activation lymphocytaire

Michelle Rosenzweig (michelle.rosenzweig@upmc.fr) Phnom Penh
Université Pierre et Marie Curie septembre 2009

DES Biologie Médicale
Cambodge - septembre 2009

CM3.2

**CELLULES PRESENTATRICES D'ANTIGENE
et
ACTIVATION LYMPHOCYTAIRE**

Michelle Rosenzweig
Service de Biothérapies/UPMC CNRS UMR7211 INSERM U959
Pitié-Salpêtrière - Paris - France
Michelle.rosenzweig@upmc.fr

Les CPAg aux Lymphocytes T
Les Cellules Dendritiques (DC)
Les Macrophages
Les Lymphocytes B

Conséquences de la présentation de l'Ag aux LT

1) Captation de l'antigène

Tissus
Sang
Muqueuses

2) Apprêtement

(Migration)

3) Présentation aux lymphocytes T

Ganglions
Rate
Plaques de Peyer
Amygdales

4) stimulation des lymphocytes T Prolifération et différenciation

1) Captation de l'antigène et apprêtement

Récepteurs

Interactions sucre-lectines

- Mannose => Récepteur au Mannose
- LPS+BP => CD14

Opsonisation:

- C3bi-CR3 (CD11b/CD18)
- IgG- FcγR

Immunoglobulines de surface (Lymphocytes B)

Phagocytose

Macropinocytose

Endocytose,

Pinocytose

2) Apprêtement

**Antigènes
cellulaires
Protéines virales**

**Antigènes
exogènes**

Cross priming

Cytosol

**Protéasome
LMP2/7**

TAP 1, 2

Réticulum Endoplasmique
Association des peptides
antigéniques aux molécules CMH I

**Expression membranaire des
complexes MHC I- peptides**

3) Présentation aux lymphocytes T

4) stimulation des lymphocytes T

Prolifération et différenciation

LFA-1 (CD11a/18)
ICAM-1 (CD54)
ICAM-1 (CD54)
VCAM (CD106)
LFA-3 (CD58)

Adhésion
ligand-récepteur

ICAM-1 (CD54)
LFA-1 (CD11a/18)
CD43
VLA-4 (CD49d/29)
CD2

CMH-I

Reconnaissance
spécifique

CMH- II

CD3
TCR
CD8

CD3
TCR
CD4

LFA-3 (CD58)
ICAM-1 (CD54)
CD40
(CD80) B7-1
(CD86) B7-2
(CD80) B7-1
(CD86) B7-2

Costimulation
ligand-récepteur

CD2
LFA-1 (CD11a/18)
CD40L
CD28
CD28
CTLA-4
CTLA-4

a- Adhesion et présentation de l'Ag

b- Reconnaissance de l'Ag et premier signal par le TCR

c- Costimulation

d- Prolifération et différenciation des L.T

CD80/CD86-CD28

Induit synthèse d 'IL-2 et expression de l 'IL-2R

CD80/CD86-CTLA-4

Inhibition du signal de prolifération

THYMUS: tolérance centrale= sélection négative

Tolérance périphérique

Anergie: absence de signal 2= absence de réponse

Rôle des molécules de costimulation: Cinétique de l'interaction APC-LT

Cellule dendritique

CD80/CD86
IL-12
TNF- α

Macrophage

CD80/CD86
IL-1
IL-12
TNF- α
NO
Activité cytotoxique

Lymphocyte B

CD80/CD86
Prolifération
Différenciation
commutation isotypique

a) Présentation des antigènes associés aux CMH I aux LT CD8+

N'est pas restreinte aux seules CPAg mais à toutes les cellules qui expriment le CMH I. La stimulation des lymphocytes T CD8+ naïfs n'est cependant assurée que par les cellules dendritiques

- *Ag en causes*

Ag du cytosol

- Ag du soi
- Ag viraux lors d'une infection replicative

Ag exogènes

- Microorganismes qui lysent la paroi du phagosome
- Macropinocytose (cross priming)

b) Présentation des antigènes associés aux CMH II aux LT CD4+

Expression des molécules du CMH II est généralement restreinte aux CPAg (dite « professionnelles »)

- *Ag en causes*

Ag exogènes

- Captés par endocytose, macropinocytose ou phagocytose

- 1) Cellules dendritiques
- 2) Macrophages
- 3) Lymphocytes B

Points communs

Origine hématopoïétique

Captent l'antigène, l'apprêtent et l'expriment à leur surface associé aux molécules du CMH

Expriment de façon constitutive ou inductible

- Des molécules de CMH
- Des molécules d'adhésion
- Des molécules de costimulation

Différences

Mode de capture de l'antigène

Types d'antigènes captés et présentés

Niveau d'expression

- des molécules du CMH
- molécules d'adhésion et de costimulation

Lymphocytes T stimulés

- CD4 ou CD8
- Naïf ou mémoire (réponse primaire/secondaire)

1) Localisation aux portes d'entrée de l'antigène

Epiderme et muqueuses: cellules de Langerhans

Tissus: DC interstitielles

Leur recrutement dans les tissus est gouverné par l'expression de récepteurs aux chimiokines inflammatoires

2) Captation des antigènes

- Les récepteurs
 - Récepteurs au Mannose
 - FcR
 - Récepteurs au complément
- pinocytose
- phagocytose
- macropinocytose

3) Apprêtent l'Ag et migrent vers les organes lymphoïdes

Cette migration est gouverné:

la présence locale de médiateurs de l'inflammation
diminution des récepteurs de chimiokines 'inflammatoires'
⇒ quittent les tissus;
expression de récepteurs aux chimiokines produites dans les organes lymphoïdes

Au cours de leur migration elles subissent un processus de maturation qui se traduit par:

- Diminution capacité à capter des antigènes
- Expression membranaire et stabilisation des complexes peptides-CMH +++ (10-100x plus que les autres CPAg)
- Expression augmentée des molécules de costimulation (CD40, CD80, CD86) et d'adhésion (CD54, CD58)

4) Les DC sont les CPAg les plus puissantes

- CPAg qui peuvent induire la stimulation de LT naïfs (CD4 et CD8)

Les DC sont les CPAg les plus puissantes

CD4 naif

Réponse primaire +++

(T autologues +Ag nominaux)

Réponse allogénique +++

**Prolifération
Différenciation**

**CD4
activé**

Cible

**Lymphocyte B, Macrophage...
(Régulation des réponses immunes)**

Les DC sont les CPAg les plus puissantes Rôle dans l'immunité antivirale+++

1) Localisation

Sang et organes lymphoïdes

2) Captation des antigènes

- Récepteurs

- Immunoglobulines de surface (spécificité +++)

- Captent et présentent

- des antigènes solubles:

- toxines bactériennes, allergènes, toxiques

- antigènes bactériens et viraux

3) Interactions Lymphocyte B (CPAg)/Lymphocyte T

- Stimulation secondaire (la stimulation primaire est induite par DC)

- Rôle important dans la régulation de la réponse immune humorale

1) Localisation

- Sang = monocytes (précurseurs des macrophages)
- Organes lymphoïdes
- tissus conjonctifs et cavités corporels

2) Captation des antigènes

- Récepteurs
 - Récepteurs au Mannose
 - CD14
 - FcR
 - Récepteurs au complément
- Phagocytose +++
- Captent et présentent des antigènes particuliers
 - bactéries extracellulaires

3) Interactions macrophage (CPAg)/Lymphocyte T

- Stimulation secondaire (la stimulation primaire est induite par DC)
- Rôle important et dans les phases effectrices de la réponse immune cellulaire
- Jouent également un rôle important au cours de la réponse immune innée
- Les macrophages sont distribués dans de nombreux tissus mais ne sont pas tous des CPAg

Les CPAg aux Lymphocytes B

Les cellules folliculaires dendritiques (FDC)

Les CPAg aux Lymphocytes B

Les cellules folliculaires dendritiques

Origine fibroblastique (?)

Distribution: follicules des organes lymphoïdes

Captent des antigènes sous formes de complexes immuns grâce à leurs FcR et récepteurs au complément

Présentent des Ag natifs sans l'apprêter (pas de présentation associées aux molécules du CMH)

Peuvent conserver des Ag à leur surface pendant très longtemps

Rôle dans:

- la formation des centres germinatifs
- la sélection des clones B de haute affinité
- la constitution et le maintien d'un pool de lymphocytes B mémoires

Type I

Type II = Beaded FDC

Dans le centre germinatif

1) LT/LB

- Prolifération
- Mutations somatiques
- Commutation isotypique

2) FDC/B

- Sélection des clones de haute affinité pour l'Ag

Mort

Affinité +++

Survie

Plamocytes
(Moelle)

B mémoires