Introduction à la biologie des parasites Immunité anti-parasitaire (4^{ème} partie)

Pascal Launois
Université de Lausanne
IF2004 IP-d,e,e'
5, 6 et 8 avril 2004

Parasite et système immunitaire

- Le parasite:
 - Longue durée de vie (chronicité?)
 - Métamorphose
 - Multiples stades de développement
 - Variation antigénique
 - Mécanismes d'évasion
- Le système immunitaire :
 - Réponse à médiation cellulaire (cellules T)
 - Réponse humorale (cellules B)

Importance des infections parasitaires

- Pays en voie de développement
- Infections émergentes dans les pays dits développés
 - Cryptosporidies
 - Toxoplasma gondii
- SIDA
 - T. gondii

Parasitoses chez l'homme

Parasite	Incidence (nombre/cas)	Prévalence (nombre/cas)	Méthode de contrôle
Protozoaires			
Balantidie	30/500 millions	Néocomu	contrôle du contact, traitement, moustiquaires
Maladie Chagasic (<i>T. cruzi</i>)	80/1000	18 millions	Contrôle du vecteur
Léishmanioses	18 millions	12 millions	Contrôle du vecteur, traitement
Maladie osseuse (<i>Leishmania infantum</i>)	Néocomu	30/1000	Contrôle du vecteur
Helminths			
Ascaris		250 millions	traitement, hygiène
Shistosomiase		200 millions	traitement, hygiène
Ankylostomoses		15 millions	traitement, hygiène
Étiarioses lymphatiques		120 millions	traitement, hygiène
Onchocercose		18 millions	traitement

La réponse immunitaire

- Les différents éléments de la réponse immunitaire
 - Les cellules T produisent des cytokines
 - CD4⁺ reconnaissant les antigènes dans le contexte du CMH de classe II
 - CD8⁺ reconnaissant les antigènes dans le contexte du CMH classe I
 - Les cellules B produisant les anticorps
 - Les autres cellules
 - NK
 - NK1.1
 - Cellules γ/δ etc...
 - Les cellules présentant l'antigène : macrophages, cellules dendritiques

La réponse Th1/Th2

Réponse Th1

Réponse Th2

Réponse Th1/Th2 et infection naturelle

- Réponse protectrice = élimination totale du parasite
 - Évènement rare
- Réponse protectrice partielle
 - Infection chronique et persistante (parasites non complètement éliminés)
 - Empêche l'infection mortelle
 - Induit souvent certaines pathologies
- Réponse Th1 protectrice = intra cellulaire (leishmanioses)
- Réponse Th2 protectrice = extra cellulaire (helminthiases)

Plan

1. Les réponses induites par différents parasites
 - réponse Th1 protectrice
 - réponse Th1 pathologique
 - réponse Th2 protectrice
 - réponse Th2 pathologique
2. L'influence de la réponse immunitaire envers le parasite sur les autres réponses (auto-immunité?)
3. Les mécanismes utilisés par le parasite pour échapper au système immunitaire
3. les stratégies utilisables dans le développement d'un vaccin (paludisme)

Réponse Th1 protectrice

- Protozoaires
1. Leishmania major

Leishmanioses

Leishmaniose cutanée

Leishmaniose viscerale

Leishmaniose mucco-cutanée

Le modele murin d'infection par *L. major* = Leishmaniose cutanée

Réponse Th1 protectrice et infection à *L. major*

- Résolution des lésions
 - Activation des macrophages par l'IFN- γ produit par les cellules NK et CD4⁺ Th1
 - IFN- γ ^{-/-}, IFN- γ R^{-/-} et iNOs^{-/-} sur un background génétique résistant $\Rightarrow$ sensibles
 - Traitement avec inhibiteur de NO synthase (L-N6-iminoethyl-lysine) $\Rightarrow$ sensibles
- Protection = non sterile
 - Traitement lors de la resolution des lésions par inhibiteur de la NO synthase $\Rightarrow$ reactivation des lésions

Réponse Th1 et *Trypanosoma cruzi*

- Protozoaires
 - 2. *Trypanosoma cruzi* (*Trypanosomiase américaine*)

Trypanosoma cruzi (maladie de Chagas)

Maladie de Chagas

Phase aigue initiale

- Signes locaux: oedème au niveau piqure aspect "furuncle"
- Signes généraux : fatigue, fièvre 1-2 mois, adénopathies, hépatosplénomégalie
- Signes localisés : cardiaque (tachycardie) et neurologiques (convulsions)

guérison 1-2 mois

Phase silencieuse asymptomatique (10-20 ans)

Phase chronique (30%)

- formes cardiaques : cardiomegalie avec risque de mort subite
- formes digestives mega-organes (oesophage et colon)
- neuropathies avec des troubles moteurs et sensitifs

!!! Chez immunodéprimés = méningo-encéphalite et cardiopathie aigue

Réponse Th1 protectrice et maladie de Chagas

- Protection dépendante des CD8⁺
 - Souris déficientes en CMH classe I (I^{-/-}) ou en β2 microglobuline (β2m^{-/-}) sur fond génétique résistant => sensibles
- Protection dépendante de l'IFN-γ
 - Administration IFN-γ diminue les lésions
 - Neutralisation de l'IFN-γ augmente les lésions

=> Protection = CD8⁺ produisant de l'IFN-γ
 => (en accord avec le fait que *T. cruzi* puisse sortir des vésicules intracellulaires pour devenir cytosolique)

Plasmodium falciparum

Protozoaires
3. *P. falciparum*

Risques de paludisme (selon l'OMS)

Zones A : RISQUE GÉNÉRALEMENT FAIBLE ET SAISONNIER, pas de risque dans de nombreuses régions (par exemple dans les zones urbaines). *P. falciparum* absent ou sensible à la chloroquine.
Zones B : RISQUE FAIBLE, la chloroquine protège contre *P. vivax*; prise avec du proguanil, elle confère une certaine protection vis-à-vis de *P. falciparum*.
Zones C : RISQUE ÉLEVÉ EN AFRIQUE, sauf dans quelques régions en altitude. RISQUE FAIBLE EN ASIE ET EN AMÉRIQUE (sauf dans quelques parties du bassin amazonien). *P. falciparum* résistant à la chloroquine ou multi-résistant. Résistance à la sulfadoxine-pyriméthamine fréquente en Asie, variable ailleurs.

N.B. :- Pas de paludisme : Maldives, Seychelles, Macao, Hong-Kong, la Réunion, Singapour, Brunei-Darussalam.
 - Océan Indien : Ile Maurice: zone A; Comores: Zone C
 - en Océanie : paludisme à l'ouest de Vanuatu seulement (Vanuatu inclus en zone C). Antilles: palu en Haïti.

Réponse Th1 protectrice et paludisme

- Cycle complexe.
 - 2 stades intra cellulaires
 - Hépatocytes (MCH classe I positive)
 - GR (pas de MCH classe I et II)
 - 1 stade extracellulaire

⇒ Réponse anticorps contre les sporozoites/stades erythrocytaires
 Transfer d'anticorps (*P. berghei* ou *P. yoelli*) = protection

⇒ Réponse Th1 contre les stades intra hépatiques
 Administration d'IL-12 souris et singes = résistance (*P. cynomolgi* ou *P. yoelli*)
 Clone Th1 produisant de l'IFN-γ = protection lors transfer adoptif
 souris IL-12^{-/-} = infection létale
 souris IFN-γ^{-/-} et IFN-γR^{-/-} = sensible à l'infection létale

Réponse Th1 protectrice et *T. gondii*

- Protozoaires
- 4. *T. gondii*

T. gondii

Réponse Th1 protectrice et *T. gondii*

- Infection à *T. gondii* non restreinte à l'homme
- Chez l'individu non immunodéprimé
 - Infection chronique
 - Enkystement dans les muscles et le SNC
- Nécessité de l'IFN-γ et du TNF-α
 - Neutralisation de l'IFN-γ et/ou du TNF-α = dissémination
 - inhibition de la NO synthase = dissémination
- Nécessité des CD4 et des CD8
 - Depletion des CD4 et/ou des CD8 = dissémination
- Vaccination avec une souche avirulente protège contre une infection

⇒ CD4⁺ IL-2⁺ CD8⁺ IFN-γ

Réponse Th1 protectrice et protozoaires

- Role of CD4⁺ Th1 = Leishmaniose
- Role des CD8⁺ Th1 = maladie de Chagas
- Role des CD4⁺ et CD8⁺ Th1 = Toxoplasmose

Réponse Th1 et pathologie

- Malaria cérébrale
 - Chez l'homme
 - Congestion des vaisseaux (sequestration des GR infectées)
 - Hémorragies
 - Oedeme cérébral?
 - Chez la souris (*P. berghei* ANKA)
 - Hémorragies
 - Oedeme cérébral
 - adhésion de monocytes et de parasites sur les vaisseaux endothéliaux cérébraux

Réponse Th1 et malaria cérébrale chez la souris

- Depend de
 - CD4, CD8, γ/δ T cells
 - IFN- γ , TNF- α
 - Neutralisation = prevention de la CM
 - LT α
 - Taux élevés dans CM

Réponse Th1 et pathologie des helminthes

- Filarioses
 - *Wuchereria bancrofti*
 - *Brugia malayi*
 - *Brugia timori*

Réponse Th1 et pathologie des filarioses

Cycle:

- Microfilarie dans le sang
=souvent asymptomatique
- Ver adulte dans les vaisseaux sanguins = pathologie sévère type éléphantiasis

• Cellules T stimulées

- IFN- γ = pathologie sévère
- IL-4, IL-10 = microfilarémie

Réponse Th1 et pathologie

Th1 induit elle-même la pathologie?

malaria cérébrale

Impossibilité de développer une réponse Th2 qui normalement régule la réponse Th1 ?

⇒ Modèle d'infection par *Toxoplasma gondii*

• T. gondii

-souche ME49 haute dose voie orale

-C57BL/6 réponse Th1 avec inflammation très sévère iléon (iléite)
/ absence d' IL-4 et IL-10 chez C57BL/6

-BALB/c réponse Th1 mais réaction intestinale minimale
/présence d' IL-4 et IL-10 chez BALB/c

-souris BALB/c IL-4^{-/-} et IL-10^{-/-}
= mortalité accélérée avec augmentation de la réponse Th1

Réponse Th2 et protection

• Helminths

- *Trichuris muris*
- *Nippostrongylus braziliensis*
- *Strongyloides stercoralis*

- Association réponse Th2 et résistance à l'infection

• Quels mécanismes ?

- Production IgE/IgG1
 - » transfert IgE associé à l'expulsion de *Trichinella spiralis*
 - » augmentation des IgG1 associée à l'expulsion de *T. spiralis*
 - » complexe Ac-Ag = Anticorps dépendant cytotoxicité ADCC
- Mastocytes
 - » Souris déficientes en mastocytes = pas d'expulsion des vers
- Cytokines Th2 :
 - » IL-4, IL-13, IL-9 ????

Réponse Th2 et pathologie

- *L. major*

Schistoma mansoni : particularités

S. mansoni : particularités

- Passage des oeufs des vaisseaux ⇒ intestin = perforation
 - ⇒ Inflammation
 - ⇒ Passage de bactéries = exposition aux endotoxines bactériennes ⇒ cachexie
 - réponse Th1 associée à la morbidité (cachexie)
 - Neutralisation du TNF-α = baisse de la morbidité
 - Importance des lésions corrélée avec la production de NO
 - réponse Th2 = protection contre la réponse inflammatoire trop importante
 - souris déficientes en IL-4 = augmentation de la morbidité
- ⇒ La réponse Th2 contrôle la pathologie médiée par la réponse Th1

S. mansoni : particularités

- Formation du granulome dans le foie
 - association granulome et réponse Th2
 - Oesinophiles dans le granulome
 - CD4 nécessaire à la formation du granulome
 - Neutralisation IL-4 = baisse de la taille du granulome
 - ⇒ CD4 Th2 nécessaire à la formation du granulome
 - Role du granulome?
 - Pathologie .
 - Association avec fibrose et insuffisance hepaticque
 - Association Th2/fibrose :
 - » Neutralisation IL-4 = baisse de la fibrose
 - Protection
 - SCID mice = pas de granulome et mort par necrose cellulaire
- ⇒ Alternative pour ne pas mourir et compromis pour vivre avec l'infection

***S. mansoni* : conclusions**

- Réponse Th2
 - Plutot protectrice dans le passage des oeufs des vaisseaux vers l'intestin
 - Plutot pathologique dans la formation du granulome dans le foie

⇒ complexité des problèmes à élucider avant l'obtention d'un vaccin
développement d'une réponse Th1
développement d'une réponse Th2
fine balance entre les 2

développement d'une réponse Th1 protectrice
protozoaires

développement d'une réponse Th2 protectrice
helminths

fine balance entre réponse pathologique Th1 et
régulatrice Th2

⇒ complexité des problèmes à élucider avant l'obtention d'un
vaccin anti - parasitaire

⇒ comprendre la différenciation Th1/Th2

Quels sont les facteurs influençant le développement
d'une réponse Th1 ou Th2 ?

Quels sont les facteurs influençant le développement
d'une réponse Th1 ou Th2 ?

- La nature de l'antigène
 - Il n'existe pas d'antigène Th1 ou Th2
 - Dépend de la nature du milieu
- La voie d'administration de l'antigène
 - L'injection iv de *Leishmania* induit la protection contre l'injection ultérieure par voie sc chez la souris sensibles
- Le site d'inoculation
 - *L. major* dans le coussinet plantaire de souris résistantes SWR = réponse Th1
 - *L. major* dans le dos = réponse Th2
- La dose d'antigène
 - Basse dose = Th2
 - Haute dose = Th1

Quels sont les facteurs influençant le développement d'une réponse Th1 ou Th2 ?

- La nature des APC
 - Macrophages et DCs = réponse Th1
 - Cellules B = réponse Th2
- La nature des facteurs de co-stimulation
 - CD40-CD40L = réponse Th1
 - CD86 = réponse Th2
 - CTLA-4 = résolution des réponses Th1 et Th2
 - Reconnaissance CD28 sur les cellules T et B7.1 (CD80) et/ou B7.2 (CD86) sur les APC
 - Régulation positive de CTLA-4 sur les cellules T
 - Liaison sur CD80-CD86 (meilleure affinité)
 - Signal négatif = résolution de la lésion

Quels sont les facteurs influençant le développement d'une réponse Th1 ou Th2 ?

- L'affinité du TCR pour le peptide reconnu
 - Faible affinité = réponse Th2
 - Forte affinité = réponse Th1
- La nature des cytokines
 - IL-4, IL-10 and IL-13 = réponse Th2
 - IL-12, IL-27, IFN = réponse Th1
- Autres ?
 - facteurs génétiques ????

2. L'influence de la réponse immunitaire envers le parasite sur les autres réponses

A. sur les réponses contre d'autres pathogènes

- Immunosuppression
 - Impossibilité des cellules T à proliférer en réponse à des antigènes spécifiques autres que ceux du parasite ou à des mitogènes
 - augmentation des maladies intercurrentes (paludisme)
 - Immunodéviatation
 - Modulation de la réponse induite par le parasite sur une autre réponse
 - Ex. Infection par *Mycobacterium bovis* BCG
 - BCG Injecté souris saines ⇒ Th1
 - BCG injecté souris infectées par helminthes ⇒ Th2
- ⇒ Important dans les campagnes de vaccination +++
ex: région endémique pour la schistosomiase et filariose = moins bonne réponse au vaccin anti-tétanique

2. L'influence de la réponse immunitaire envers le parasite sur les autres réponses

- A. sur les réponses auto-immunes
 - Diabète insulino-dépendant dans les souris NOD ⇒ réponse Th1 envers les cellules pancréatiques
 - infection à *S. mansoni* ⇒ réponse Th2
 - Souris NOD infectées par *S. mansoni*
 - Réponse Th2 avec inhibition de la réponse Th1 envers les cellules pancréatiques
 - Moins de diabète
- ⇒ Influence de l'infection parasitaire sur une réponse immunitaire
- aucune preuve formelle chez l'homme
Mais possibilité à ne pas écarter.

3. Les mécanismes d'échappement du parasite

-Echaper à la lyse du complément

MAC complex

a

-Echaper à la lyse du complément

- Molécules ayant une activité DAF, ex . *T. cruzi*
- Adhésion de DAF à la surface du parasite
- Expression de molécules capables d'inhiber l'insertion du complexe d'attaque membranaire sur le parasite (MAC), ex *T. brucei*

- **Evasion immunitaire**
 - surtout parasite extracellulaire
 - P. falciparum*
 - T. rhodensiensis* (trypanosomiase africaine)
 - expression de molécules de surface tres variable = variant
 - Trypanosoma*
 - VSG Variant Surface Glycoprotein chez *Trypanosoma*
 - exposée à la surface d'un parasite
 - Plasmodium falciparum*
 - genes VAR (50-150 variants)
 - PfEMP1 P.f. Erythrocyte Membrane Protein 1
 - expression sur GR infecté

The clinical course of trypanosome infection

Number of parasites (red line) and levels of antibodies (blue line) over time (weeks). The graph shows periodic waves of parasites and antibodies, with parasite levels peaking before antibody levels rise significantly.

- Dérobertement immunitaire (pathogènes intra-cellulaires)**
 Envahissement des cellules sans les activer
Leishmania

 Inhibition spécifique d'IL-12
 autres cytokines inflammatoires = production normale
 Th2 cytokines (IL-10) = pas de rôle
 ⇒ peu d'IFN-γ ⇒ pas d'activation des macrophages
 ⇒ survie du parasite

- Camouflage (*S. mansoni*)**
 Association de molécules à la surface du parasite pour empêcher l'action des anticorps
 mécanisme jamais vraiment prouvé
 mais possible (cf rôle du traitement par Praziquantel)

 Praziquantel = altération de la paroi du parasite
 Abs reconnaissance protéines de surface après traitement par Praziquantel
 rôle?

- Déviatoin de la réponse immunitaire au profit du parasite**
 – *T. muris*
 Réponse Th1 = survie du parasite
 Réponse Th2 = expulsion du parasite

 Exploitation au profit du parasite
 présence de molécules à la surface du parasite de molécules ressemblant à l'IFN-γ

Vaccination dirigée contre les stades pré-erythrocytaires

- Irradiated sporozoites = protection

Anticorps dépendante : CSP antigène de CircumSporozoite
neutralise les sporozoïtes AVANT l'entrée dans le foie

CD8 dépendante (IFN- γ)
induction de NO dans les hépatocytes

Autres antigènes cibles de la réponse immune

SSP2/TRAP Sporozoite Surface Protein 2/ Thrombospondin Related Anonymous Protein

STARP Sporozoite Threonine and Asparagine Rich Protein

SALSA Sporozoite And Liver Stage Antigen

LSA-1 Liver Stage Antigen-1

MSP-1 Merozoite Surface Protein 1

Vaccination dirigée contre les stades pré-erythrocytaires

- Plusieurs problèmes

- Anticorps

- nécessite de très hauts taux d'anticorps anti-CSP pour être efficace chez la souris

- CD8 /IFN- γ /NO

- uniquement après injection unique (jamais si doses répétées)
- or infection multiples chez les sujets vivant en zone d'endémie

- Echappement d'un ou plusieurs sporozoïtes :

- quel effet sur la pathologie?

Vaccination dirigée contre les stades pré-erythrocytaires

- Lors des essais chez l'homme vaccinés par des sporozoïtes irradiés

- Anticorps anti-CSP et autres antigènes de surface
- Présence de CD8⁺ à activité cytolytique
 - mais pas de corrélation entre le taux et la protection

- Lors d'infection naturelle

- Anticorps dans les populations exposées du Kenya et Brésil (CSP)
- 50% des adultes au Kenya des cellules cytotoxiques contre la CSP
- Induction de CTL mémoire chez australiens ayant eu des accès palustres

Vaccination dirigée contre les stades erythrocytaires

Serait la plus adaptée car les formes erythrocytaires sont responsables de la maladie
MAIS variation antigénique importante (gènes VAR- 50 et 100 copies).

Immunité humorale +++

transfer passif d'anticorps provenant de sujets immunisés
à des enfants = protection

faciliter la destruction des GR infectés mais mécanismes non connus précisément

Cibles

MSP-1 Merozoite Surface Protein 1

AMA1 Apical Membrane Antigen 1

gènes VAR?

Vaccination anti-maladie/pathologie

- Pathologie et paludisme chez l'homme :
 - Signes cliniques
 - Fièvre, frissons,
 - Anémie
 - Hypoglycémie
 - Insuffisance rénale
 - Paludisme cérébral : congestion des vaisseaux, hémorragies cérébrales, œdème

Vaccination anti-maladie/pathologie

- Modèle animal de paludisme cérébral
 - Infection par *P. berghei* ANKA
 - Hémorragies
 - Œdème cérébral
 - Attachement des monocytes et parasites aux cellules endothéliales
 - Depend
 - Des CD4, CD8 et γ/δ (souris KO ou traitées par Ac)
 - de l'IFN- γ et de la LT α
 - Du TNF- α induit par les toxines parasitaires (GPI glycosylphosphatidylinositol)
 - Cibler ces molécules afin d'obtenir des anticorps neutralisants:
Immunisation des souris avec GPI protège contre infections
 - Immunoprophylaxie (Ac anti-TNF- α ?)

Vaccination anti-transmission

- Pourrait prévenir la transmission de variant (utilité en association avec autres vaccinations anti-*P. falciparum*)
- Intérêt dans les endroits où il n'existe pas de réservoir = éradication.
- Cible : gamètes chez l'homme
 - stades sporogoniques chez le moustique (les Acs contenus dans les repas sanguins pourraient inhiber le développement du parasite)
 - Pfs 25, 28, 230 et Pfs 48/45
 - invariant +++