

Immunoglobulines, Antigènes & Réaction Antigène-Anticorps

Adrien Six (adrien.six@upmc.fr)
Université Pierre et Marie Curie

IF-Ia
février 2011

Immunoglobulines, Antigènes & Réaction Antigène-Anticorps

1. Immunogénicité & Antigénicité
2. Epitope
3. Structure des anticorps
4. Site anticorps
5. Propriétés fonctionnelles
6. Réaction antigène-anticorps
7. Conclusion

Immunoglobulines, Antigènes & Réaction Antigène-Anticorps

1. Immunogénicité & Antigénicité

2. Epitope

3. Structure des anticorps

4. Site anticorps

5. Propriétés fonctionnelles

6. Réaction antigène-anticorps

7. Conclusion

Définitions

- Immunogénicité:
capacité à induire une réponse immunitaire humorale
ou à médiation cellulaire


Cellule B + Antigène → Cellule B effectrice + Cellule B mémoire
→ Anticorps

Cellule T + Antigène → Cellule T effectrice + Cellule T mémoire
→ cytokines
→ facteurs cytotoxiques


- Antigénicité:
capacité à se combiner “spécifiquement” avec les
produits des réponses ci-dessus
→ par ex. Antigène+Anticorps

Découverte des haptènes

- Haptène:
 - Antigène non immunogène
 - Haptène seul → pas de production d'anticorps
 - Haptène couplé à un porteur → immunogène
 - Porteur (*carrier*) = protéine immunogène
homopolymère non immunogène
 - Découverte par Landsteiner (1910)
 - établit spécificité de la réponse anticorps
 - démontre extraordinaire diversité des anticorps
 - Permet d'étudier la réponse anticorps contre des déterminants chimiques précisément définis et modifiables



Réponse anticorps anti-haptène






Injection with:	Antibodies formed:
Hapten (DNP)	None
Protein carrier (BSA)	Anti-BSA
Hapten-carrier conjugate (DNP-BSA)	Anti-DNP (major)
	Anti-BSA (minor)
	Anti-DNP/BSA (minor)

Figure 4-1
 Kuby IMMUNOLOGY, Sixth Edition
 © 2007 W. H. Freeman and Company

Spécificité de la réponse anti-haptène

TABLE 4-1

Reactivity of antisera with various haptens

	REACTIVITY WITH			
				
Antiserum against	Aminobenzene (aniline)	<i>o</i> -Aminobenzoic acid	<i>m</i> -Aminobenzoic acid	<i>p</i> -Aminobenzoic acid
Aminobenzene	+	0	0	0
<i>o</i> -Aminobenzoic acid	0	+	0	0
<i>m</i> -Aminobenzoic acid	0	0	+	0
<i>p</i> -Aminobenzoic acid	0	0	0	+

KEY: 0 = no reactivity; + = strong reactivity

SOURCE: Based on K. Landsteiner, 1962, *The Specificity of Serologic Reactions*, Dover Press. Modified by J. Klein, 1982, *Immunology: The Science of Self-Nonself Discrimination*, Wiley.

Table 4-1

Kuby IMMUNOLOGY, Sixth Edition

© 2007 W. H. Freeman and Company

Immunoglobulines, Antigènes & Réaction Antigène-Anticorps

1. Immunogénicité & Antigénicité

2. Epitope

3. Structure des anticorps

4. Site anticorps

5. Propriétés fonctionnelles

6. Réaction antigène-anticorps

7. Conclusion

Epitope: définition

- L'épitope (ou déterminant antigénique) correspond à la portion discrète de l'antigène qui entre en contact avec le récepteur spécifique d'antigène (anticorps ou TCR)
- Epitopes reconnus par les anticorps
 - Accessibilité (reconnaissance directe)
 - Séquentiel ou Linéaire (ex. 6-8 aa hélice α en surface)
 - Non séquentiel ou Conformationnel
 - Chevauchants
 - Epitopes conformationnels plus sensibles à la dénaturation ménagée de l'antigène
- Un épitope peut être immunodominant

Exemple d'épitopes








Figure 4-3
Kuby IMMUNOLOGY, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company



Myoglobine de cachalot

Lysozyme d'œuf de poule

Liaison d'un épitope conformationnel




Immunoglobulines, Antigènes & Réaction Antigène-Anticorps

1. Immunogénicité & Antigénicité
2. Epitope
- 3. Structure des anticorps**
4. Site anticorps
5. Propriétés fonctionnelles
6. Réaction antigène-anticorps
7. Conclusion


La molécule anticorps

- La molécule anticorps ou immunoglobuline est un hétérodimère composé de 2 chaînes lourdes (IgH) et 2 chaînes légères (IgL κ ou λ)




La molécule anticorps

- La molécule anticorps ou immunoglobuline est un hétérodimère composé de 2 chaînes lourdes (IgH) et 2 chaînes légères (IgL κ ou λ)
- Chaque chaîne comprend une région constante et une région variable





La molécule anticorps



- La molécule anticorps ou immunoglobuline est un hétérodimère composé de 2 chaînes lourdes (IgH) et 2 chaînes légères (IgL κ ou λ)
- Chaque chaîne comprend une région constante et une région variable
- Les chaînes IgH et IgL sont organisées en domaines
- La région variable porte le site de liaison à l'antigène ou site anticorps (Ac)



Ig membranaire – Ig sécrétée




lymphocyte B



plasmocyte

5 classes d'immunoglobulines



Organisation des gènes C du locus IgH






Figure 4-19 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Organisation des domaines Ig (1)




Organisation des domaines Ig (2)




Immunoglobulines, Antigènes & Réaction Antigène-Anticorps

1. Immunogénicité & Antigénicité
2. Epitope
3. Structure des anticorps
- 4. Site anticorps**
5. Propriétés fonctionnelles
6. Réaction antigène-anticorps
7. Conclusion

Régions hypervariables → Site Ac (1)



Régions hypervariables → Site Ac (2)



Le site anticorps est donc formé par les 6 régions CDR:
CDR1/CDR2/CDR3 IgH + CDR1/CDR2/CDR3 IgL

Site anticorps = forme




Figure 3-8 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Le site anticorps adopte une forme (structure stéréochimique) qui va interagir avec l'antigène.

Epitope & Paratope




Figure 4-13
Kuby IMMUNOLOGY, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company


L'épitope (sur l'Ag) interagit directement avec le paratope (dans le site Ac).

Immunoglobulines, Antigènes & Réaction Antigène-Anticorps

1. Immunogénicité & Antigénicité
2. Epitope
3. Structure des anticorps
4. Site anticorps
- 5. Propriétés fonctionnelles**
6. Réaction antigène-anticorps
7. Conclusion

Fonctions anticorps et effectrice

Fonction spécifique = Fonction anticorps



Fonction non spécifique = Fonction effectrice

Propriétés fonctionnelles des anticorps

	Immunoglobulin								
	IgG1	IgG2	IgG3	IgG4	IgM	IgA1	IgA2	IgD	IgE
Classical pathway of complement activation	++	+	+++	-	+++	-	-	-	-
Alternative pathway of complement activation	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Placental transfer	+++	+	++	- +	-	-	-	-	-
Binding to macrophage and phagocyte Fc receptors	+	-	+	- +	-	+	+	-	+
High-affinity binding to mast cells and basophils	-	-	-	-	-	-	-	-	+++
Reactivity with staphylococcal Protein A	+	+	- +	+	-	-	-	-	-

Figure 4-17 part 2 of 2 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Immunoglobulines, Antigènes & Réaction Antigène-Anticorps

1. Immunogénicité & Antigénicité
2. Epitope
3. Structure des anticorps
4. Site anticorps
5. Propriétés fonctionnelles
- 6. Réaction antigène-anticorps**
7. Conclusion

La réaction antigène - anticorps

- La réaction antigène-anticorps est une association bimoléculaire semblable à une réaction enzyme-substrat.
- C'est une association non-covalente et réversible.
- Elle met en jeu plusieurs forces d'interaction:
 - Liaisons hydrogènes
 - Liaisons ioniques
 - Interactions hydrophobes
 - Forces de van der Waals

Forces des interactions Ag-Ac




Noncovalent forces	Origin	
Electrostatic forces	Attraction between opposite charges	$\text{—NH}_3^+ \quad ^-\text{OOC—}$
Hydrogen bonds	Hydrogen shared between electronegative atoms (N,O)	$ \begin{array}{c} \diagup \text{N} \text{ — } \text{H} \text{ — } \text{O} = \text{C} \diagdown \\ \delta^- \quad \delta^+ \quad \delta^- \end{array} $
Van der Waals forces	Fluctuations in electron clouds around molecules oppositely polarize neighboring atoms	
Hydrophobic forces	Hydrophobic groups interact unfavorably with water and tend to pack together to exclude water molecules. The attraction also involves van der Waals forces	

Figure 3-9 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Réaction Ag-Ac & Affinité



- k_1 (L/mol/s) constante de vitesse aller (association)
- k_{-1} (s⁻¹) constante de vitesse retour (dissociation)
- $K_a = k_1 / k_{-1}$ constante d'association = affinité

$$K_a = [\text{Ag-Ac}] / [\text{Ag}] [\text{Ac}]$$

Rem: le modèle concerne la liaison d'un site de liaison anticorps (Ac) avec un antigène (Ag) monovalent.

Exemples d'affinité de liaison Ag-Ac

TABLE 6-1

Forward and reverse rate constants (k_1 and k_{-1}) and association and dissociation constants (K_a and K_d) for three ligand-antibody interactions

Antibody	Ligand	k_1	k_{-1}	K_a	K_d
Anti-DNP	ϵ -DNP-L-lysine	8×10^7	1	1×10^8	1×10^{-8}
Anti-fluorescein	Fluorescein	4×10^8	5×10^{-3}	1×10^{11}	1×10^{-11}
Anti-bovine serum albumin (BSA)	Dansyl-BSA	3×10^5	2×10^{-3}	1.7×10^8	5.9×10^{-9}

SOURCE: Adapted from H. N. Eisen, 1990, *Immunology*, 3rd ed., Harper & Row, Publishers.

Table 6-1

Kuby IMMUNOLOGY, Sixth Edition

© 2007 W. H. Freeman and Company




Figure 9-12a

Kuby IMMUNOLOGY, Sixth Edition

© 2007 W. H. Freeman and Company

Mesure de la liaison Ag-Ac

Technique de dialyse à l'équilibre:





Figure 6-2
Kuby IMMUNOLOGY, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

Courbe de Scatchard



Eq. de Scatchard:

$$r / c = K_a n - K_a r$$

n = nb sites Ac = valence

IgG: $n = 2$

IgA: $n = 4$

IgM: $n = 10$

$c = [Ag]$

$r = [Ag-Ac] / [Ag-Ac] + [Ac]$
 $([Ac \text{ lié}] / [Ac \text{ total}])$


Affinité & Avidité

- L'avidité est la résultante des affinités des multiples sites de liaison.
- L'avidité est une meilleure mesure de la capacité de liaison au sein d'un système biologique.
- Pour une IgG, avidité théorique maximale:
$$K_a \times K_a = K_{eq} = [Ag-Ac] / [Ag] [Ac]$$
- En réalité, $K_{eq} < K_a^2$, en raison des contraintes géométriques. Néanmoins, $K_{eq} \gg K_a$.
- $K_{eq} \text{ IgM} > K_{eq} \text{ IgG}$ du fait de la valence IgM malgré $K_a \text{ IgM} < K_a \text{ IgG}$.

Immunoglobulines, Antigènes & Réaction Antigène-Anticorps

1. Immunogénicité & Antigénicité
2. Epitope
3. Structure des anticorps
4. Site anticorps
5. Propriétés fonctionnelles
6. Réaction antigène-anticorps
- 7. Conclusion**

Transduction du signal BCR



Reconnaissance de l'antigène par l'Ig

Transduction du signal par Igα/Igβ (CD79α/CD79β)

Motif ITAM:




immunoreceptor tyrosine-based activation motif

(D/E)XXYXXLX₍₆₋₈₎YXXL

Isotypie, Allotypie, Idiotypie




Isotypie

→ Variabilité fonctionnelle






Allotypie

→ Variabilité individuelle



Idiotypie

→ Variabilité particulière



← Individu A →

← Individu B →

Anticorps polyréactifs

Table III. Polyreactivity of anti-DNA mAbs with or without N-addition in H-CDR3^a

mAb	N-region(s) in H-CDR3	Actin	Myosin	Thyroglobulin	IgG
64.9D	N ⁺	—	—	—	—
64.22.2	N ⁺	+++	+++	+++	+
70.1.4	N ⁺	+	+	+	—
70.3.1	N ⁺	+	+	—	—
64.3AII	N ⁺	+	+	+	+++
A.24.7	N ⁰	—	—	—	—
3.4.1	N ⁰	++	+	++	—
A.18.13	N ⁰	—	—	—	—
64.18AI	N ⁰	—	—	—	—
8.46.2	N ⁰	—	—	—	—
8.3.6	N ⁰	+	+++	—	—
A.1.11	N ⁰	—	—	—	—
64.8DI	N ⁰	—	—	—	—
27.3EIa	N ⁰	++	+++	+++	+++


^a Binding of supernatant mAbs (1 µg/ml) to immobilized Ags was tested by ELISA. The results are expressed as the OD at 492 nm: (—) represents OD < 0.1; +, 0.1 < OD < 0.3; ++, 0.3 < OD < 0.5; +++, OD > 0.5. In both N⁺ and N⁰ groups, mAbs were classified in decreasing order of their relative avidity for ssDNA (cf Fig. 1).

Comment?




- Epitope redondant
- Epitopes dégénéré
- Epitopes distincts
- ...

Reconnaissances...

4 structures différentes sans Ag



Structures avec 3 Ag différents



Superposition des régions CDRs

Reconnaissances...

